

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ООО «НПК Медэкс»
Е.В. Хохлов
01.08.2024 г.



**Инструкция
по применению мыла жидкого
«Люир» с антибактериальным эффектом
(пр-во ООО НПК Медэкс)**

Москва- 2024

Инструкция по применению мыла жидкого «Люир»

1. Общие сведения

1.1 Жидкое мыло «Люир» представляет собой готовую к применению гелеобразную жидкость со слабым запахом. Содержит в качестве действующего вещества 5-хлоро-2-(2,4-дихлорофенокси) фенол, а также комплекс ПАВ, специальные добавки, смягчающие и увлажняющие кожу рук, оказывающие противовоспалительное и ранозаживляющее действие.

1.2. Мыло содержит в составе лаурилсульфат натрия этоксилированный, кокоамидопропил бетаин, кокоглюкозид, ДЭА жирных кислот кокосового масла, хлорид натрия, глицерин, аллантоин, парфюмерная композиция, консервант (Acticide mv), лимонная кислота.

1.3. Мыло исследовано в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического законодательства, обладает антибактериальной активностью в отношении грамположительных (кроме микобактерий туберкулёза) и грамотрицательных бактерий, фунгицидной (грибы рода Кандида, *Aspergillins niger*) активностью, а также выраженными моющими свойствами (протокол исследований №22300 от 25.05.2017 г.). рН 7,0.

1.4. Мыло жидкое «Люир» антибактериальное предназначено для гигиенической обработки рук медицинского персонала (в том числе оперирующего перед использованием кожного антисептика) в лечебно-профилактических учреждениях (далее ЛПУ), станциях скорой медицинской помощи, различных лабораторий, санпропускников и т.п.; санитарной обработки кожных покровов пациентов в ЛПУ, детских дошкольных и школьных учреждений, санаториев, домов отдыха, пансионатов, учреждений соцобеспечения, предприятий коммунально-бытового обслуживания, предприятий пищевой промышленности, общественного питания, транспорта, а также населения в быту.

1.5. По токсикологическим показателям мыло относится к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007) выпускается согласно ГОСТ 31696-2012, имеет декларацию соответствия.

2. Применение

2.1. Гигиеническая обработка рук: 3-5 мл мыла нанести на влажные кисти рук и образовавшейся пеной обработать руки в течение 1 минуты, затем тщательно смыть проточной водой (при гигиенической обработке рук оперирующего медицинского персонала просушить руки стерильной салфеткой и обработать кожным антисептиком).

2.2. Санитарная обработка кожных покровов: необходимое количество мыла нанести на влажную мочалку и образовавшейся пеной обработать кожные покровы, затем пену хорошо смыть водой.

3. Меры предосторожности

- 3.1. Использовать только для наружного применения.
- 3.2. Избегать попадания в глаза.
- 3.3. Не использовать по истечении срока годности.

4. Меры первой помощи

4.1. При случайном попадании в глаза их следует обильно промыть чистой проточной водой.

4.2. При случайном попадании в желудок рекомендуется промыть его водой комнатной температуры. Затем выпить несколько стаканов воды с добавлением абсорбента (10-15 таблеток активированного угля).

5. Упаковка, транспортирование, хранение

5.1. Мыло выпускается во флаконах из полимерных материалов вместимостью 0,5 и 1 дм³ и канистры вместимостью 3 и 5 дм³ по ГОСТ Р 51760.

5.2. Допускается транспортирование любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на этом виде транспорта, в условиях, гарантирующих сохранность средства и тары.

5.4. Хранить средство в сухих складских помещениях отдельно от пищевых продуктов и лекарственных средств, в местах недоступных детям, при температуре -20°C до +40 °C.

5.6. Срок годности – пять лет со дня изготовления в невскрытой упаковке производителя.

Генеральный директор ООО «НПК Медэкс»

Е.В. Хохлов



